

- ALYSSUM SERPYLLIFOLIUM Desf.- Bastante común. Floración en Abril. Forma parte de los prados de anuales. Cañada de los Mojones (10). WH 48-55. R. 9093.
- ANDROSACE MAXIMA L.- Frecuente en zonas arvenses altas. Floración Abril. Los Valadores (La Molata) (20). WH 4-2. R. 6509.
- ANTHEMIS ARVENSIS L. ssp INCRASSATA (Loisel) Nyman.- Algo nitrófila. Floración Julio-Agosto. Cañada de los Mojones (10). WH 48-55. Frecuente. R. 6644.
- ANTHYLLIS MONTANA var. HISPANICA Cullen.- Escaso, floración Mayo-Junio. En lapiaz Balcón de los Chorros (3). WH 49-56. R. 6659.
- ARABIS VERNA. (L.) R.Br.- Frecuente. Nitrófila. Floración Marzo-Abril. Cañada de los Mojones (3). U.T.M. WH 48-55. R. 6515.
- ARENARIA ARMERINA var. ELONGATA (Bory) Boiss.- Común en los lapiares, entre matas "borreguiles". Floración en Junio. Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. Sierra del Ardal (17). WH 56-46. R. 6517.
- ARENARIA GRANDIFLORA (L.) var. ABIETINA. Presl.- En zonas de lapiaz, con floración en Junio Viboreros (Calar del Mundo) (10). WH 50-54. R. 6655.
- ARENARIA MODESTA Dufour.- Muy común en prados de anuales. Floración en Abril. Calar del Mundo (3). WH 48-55. R. 6625.
- ARENARIA SERPYLLIFOLIA L. ssp LEPTOCLADOS Rehb.- Escasa, no incluida en el herbario que acompaña al trabajo por no poseer nada más que una muestra. Floración Mayo. Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 6628.
- ARENARIA TETRAQUETRA L.- De aspecto pulvinular, escasa. Floración a mediados de Mayo y primeros de Junio. Cañada de los Mojones (10). WH 48-55. R. 6518.
- ARISTOLOQUIA LONGA L.- Nitrófila. Se encuentra en zonas de humedad, bajo crestas de lapiares, aunque no es muy abundante. Cañada de los Mojones (3) (10). WH 47-55. Floración principios de Mayo. R. 6640.
- ARMERIA FILICAULIS (L.) ssp minor. (Boiss) Borja.- Forma almohadillas pulvinulares. Floración Mayo-Junio. Cañada de los Mojones (3) U.T.M. WH 48-55. R. 1574.
- ASPHODELUS ALBUS Miller.- Floración mediados de Abril. Forma comunidades muy frecuentes en laderas y sobre los lapiares. Sus hojas son muy apetecidas por el ganado. Cañada de los Mojones (3) (10). WH 48-55. R. 6523.
- ASTRAGALUS GLAUX L.- Floración Mayo. Comparte los mismos hábitats que el anterior. Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 6524.
- ASTRAGALUS INCANUS (L) ssp. MACRORRHYZUS (Cav) Chater.- Floración Mayo. Frecuente en zona de prados o de pedregales. Cañada de los Mojones (10). WH 48-55. Los Voladores (La Molata) (20). WH 4-2. R. 6525.
- AVENA FILIFOLIA ssp VELUTINA Lag.- Muy frecuente en el mes de Junio sobre prados altos más o menos pedregosos. La Molata (20). WH 4-2. R. 9085.
- BELLIS PERENNIS L.- Frecuente en prados de anuales. Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. Los Voladores (20). WH 47-44. Floración Abril-Mayo. R. 6647.
- BONBICILAENA ERECTA (L.) Smolj.- Floración Junio. Bastante frecuente. Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. Campamento de San Juan. WH 47-58. R. 9092.
- BRACHYPODIUM DISTACHYUM (L.) P.B. subvar. PLATYSTACHYUM Ball in Coss et Dur.- Frecuente en prados de anuales en suelos descalcificados, de "terra rosa", con floración preferente en Mayo. Cañada de los Mojones. WH 48-55.