

- BRACHYPODIUM RAMOSUM (L.) R. et Sch.- Muy común en prados de encinares y entre matorrales. Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 5289.
- BRIZA MINOR L.- Escasa. Floración mediados de Junio. En prados de anuales. Campamento de San Juan (3). WH 47-58. Cañada de los Mojones (10). WH 48-55. R. 6528.
- BROMUS INTERMEDIUS Guss.- Floración desde mediados de Mayo y Junio. Muy frecuente en prados de pinar (Pino Laricio) y en zonas de lapiaz. Cañada de los Mojones (10) WH 48-55. Sierra de Cujón (5). WH 59-58. R. 9096.
- CAMPANULA DECUMBENS A. DC.- Endemismo muy frecuente en prados de anuales y sobre lapiaz. Floración en Junio. Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. Sierra de Cujón (6). WH 59-58. R. 9083.
- CARDAMINE HIRSUTA (L) var. latifolia. Rivas Goday.- Nitrófila, frecuente en huecos de lapiaz, donde se acumula el excremento del ganado. Mesones (4). Abril-Marzo. U.T.M. WH 56-60. R. 9079.
- CATAPODIUM RIGIDUM (L) C.E. Hubbard.- Abundante en prados de anuales. Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. Floración Junio. R. 9095.
- CERASTIUM BOISSIERI Green.- Frecuente formando ramilletes en praderas de Pino Laricio y sobre lapiaz en fisuras. Floración Abril. Cañada de los Mojones (10). WH 48-55. R. 6626.
- CERASTIUM GLOMERATUM Thull.- Abundante, formando matitas cespitosas. Abril-Mayo. Cañada de los Mojones (3) (10). U.T.M. WH 48-55. R. 6652.
- CLYPEOLA MICROCARPA Cav.- Escasa, sobre prados de anuales. Floración Mayo. Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 6650.
- CORONILLA MINIMA L.- Floración en Mayo. Frecuente en prados de anuales. Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 6658.
- CROCUS NEVADENSIS Kit.- Escaso, endémico; frecuente en zonas de lapiaz o prados pedregosos. Cañada de los Mojones (10). WH 48-55. Sierra del Ardal (17). WH 56-46. Floración Febrero. R. 6545.
- CROCUS NUDIFLORUS S.M. In Sowerby.- Endemismo no muy abundante que florece en Septiembre. Generalizado. Fuente de Pradomira (La Molata) (20). WH 45-45. R. 6546.
- CYNOSORUS ECHINATUS L.- Con floración en Junio. Muy común en prados de anuales. Viboreros (10), entre lapiaz y fondos de dolinas; (Calar del Mundo) WH 50-54. R. 6627.
- DACTYLIS GLOMERATA L. ssp. HISPANICA (Rothm) Nyman.- Frecuente en prados y herbazales. Floración Julio. Fuente del Tejo (2). WH 42-61. Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 9088.
- DIANTHUS SCABER Chaix y Vill.- Floración Julio. Frecuente sobre claros de pinar. Cañada de los Mojones (10). WH 48-55. R. 6624.
- ECHINARIA CAPITATA (L.) Desf.- Frecuente. Floración, Junio. Cañada de los Mojones (3) (10) WH 48-55. Los Voladores (20). En La Molata del Imperio, WH 47-44. R. 6638.
- ERODIUM CICUTARIUM ssp. CICUTARIUM (= ERODIUM PRIMULACEUM (Lange) Welw et Lange).- Abundante. Floración Abril-Mayo. Sobre prados de Anuales. Cañada de los Mojones (3) (10). WH 48-55. R. 9077.
- ERODIUM DAUCOIDES Boiss. (E. Cazortanum Heywood).- Floración primeros de Junio. Frecuente sobre prados pedregosos de altitud 1.700 m. Los Voladores (20). (La Molata). WH 46-44. R. 9076.
- FILAGO MICROPODIOIDES Lange.- Floración en Mayo. Abundante, formando almohadillado sobre prados de anuales. Cañada de los Mojones. WH 48-55.