

- FRITILLARIA LUSITANICA Boiss. et Reuter.- Endemismo, escaso. Aparece sobre grietas de lapiaz. Floración finales de abril, primeros de mayo. Balcón de los Chorros, Cañada de los Mojones. WH 49-56.
- GERANIUM LUCIDUM L.- Floración Mayo. Frecuente en prados de anuales profundos y entre roquedos de lapiaz. Cañada de los Mojones 48-55.
- HERNIARIA HIRSUTA L.- Abundante en los prados de anuales. Floración Abril. Forma un césped compacto almohadillado sobre la terra rossa. Cañada de los Mojones (3) WH 48-55. R. 6623.
- HIERACIUM PILOSELLA L.- Floración Abril-Mayo. Frecuente sobre prados. Cañada de los Mojones (3) (10). WH 48-55. R. 9095.
- HIPPOCREPIS COMOSA L.- No muy frecuente. Sobre prados de anuales. Floración Mayo. Cañada de los Mojones (3) WH 48-55. R. 6660.
- KNAUTIA ARVENSIS (L) Coulter.- Abundante en zonas de lapiaz. Floración Mayo. Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 6635.
- LEPIDIUM HIRTUM ssp HIRTUM (L) S.M.- Frecuente. Floración Marzo-Mayo. Cañada de los Mojones (3) (10). WH 48-55. Sierra del Cujón (6) WH 59-58. R. 9096.
- LINARIA VISCOSA (L.) Dum-Courset.- Muy abundante en años húmedos. Floración a mediados de Mayo. Cañada de los Mojones (3). U.T.M. 30 S WH 48-55. R. 9081.
- LOLIUM PERENNE (L) forma CRISTATUM Pers.- Muy común, floración Mayo. Cañada de los Mojones (10). WH 48-55. R. 4991.
- MEDICAGO ARABICA All.- Como el anterior. Floración Mayo. Cañada de los Mojones (3) WH 48-55. R. 6662.
- MEDICAGO CILIARIS Willd.- Común. Floración Mayo. Sobre prados de anuales. Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 6661.
- MINUARTIA HYBRIDA (Will) Schischkin.- Frecuente en prados de anuales. Floración Mayo. Cañada de los Mojones (3) WH 48-55. R. 6656.
- MYOSOTIS RAMOSSISIMA Rochel in Schultes.- Floración Mayo. Bastante abundante, soprados de encinares aclarados. Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 7057.
- NARCISSUS HEADREANTHUS (Webb y Heldr) Colmeiro.- Formando praderas naturales en los meses de Febrero-Marzo, sobre prados de anuales. Cañada de los Mojones (3) WH 48-55. R. 6565.
- NARCISSUS TRIANDRUS L. ssp PALLIDULUS (Graells) D.A. Webb.- Floración Marzo-Abril. Huecos de lapiazes o prados de suelo profundo. Cañada de los Mojones (10) (3) WH 48-55. Los Voladores (20) (La Molata) WH 47-43. R. 6566.
- ONOBRYCHIS PENDUNCULARIS (Cav) DC ssp PEDUNCULARIS.- Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. Floración Mayo. Común en prados de anuales. R. 6663.
- ORCHIS LAXIFLORA ssp LAXIFLORA Lam.- Común en lugares herbosos húmedos. Floración mediados de Mayo a primeros de Junio. Cañada de los Mojones (3) (10). WH 48-55. R. 6579.
- ORCHIS MORIO ssp CHAMPAGNEUXII Baern.- Como la anterior, frecuente en prados en el mes de Mayo. Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 6581.
- PARENTUCHELLIA LATIFOLIA (L.) Carnel in Pers.- Muy común en los prados de anuales. Floración mediados de Mayo. Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 9080.
- PARONYCHIA ARGENTEA Lamm.- Común en prados y zonas de lapiaz. Balcón de los Chorros (3) WH 49-56. Fuente de las Raigadas (10) WH 46-53. R. 6657.