

- PETORRHAGIA PROLIFERA (L.) P.W. Ball y Heywood.- Floración en Junio. Muy común sobre prados aclarados de pino laricio. Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. Viboreros (10) (Calar del Mundo) WH 50-54. R. 6654.
- PLANTAGO LAGOPUS L.- Frecuente en los prados de anuales. Cañada de los Mojones (3) WH 48-55. Floración Mayo. R. 9097.
- POA BULBOSA var. VIVIPARA L.- Muy abundante sobre prados de anuales. Floración Abril-Mayo. Cañadas de los Mojones (3). WH 48-55. Praderas del Rio Mundo (4). WH 54-60. R. 9100.
- POA LIGULATA Boiss var. MAURETANICA Maire.- Prados de anuales en zonas de altitud. Floración Mayo. Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 9073.
- RANUNCULUS GRAMINEUS L.- Endemismo frecuente en los prados de diversas alturas. Floración Mayo. Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 9074.
- RANUNCULUS GREGARIUS ssp. GREGARIUS Bro. (**R. nevadensis**, Willk).- En prados altos, no muy frecuente. Floración Mayo. Cañada de los Mojones (3) WH 48-55. R. 9075.
- RANUNCULUS MALESSANUS Degen y Hervier.- Escaso en prados de anuales. Floración Mayo Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 9072.
- RANUNCULUS PALUDOSUS Poir. Vd. CINERANSCENS.- Algo escaso, se presenta en prados de cierta humedad. Característico del **O. Poetalia bulbosae**. Floración Mayo. Cañada de los Mojones (3) (10). WH 48-55. R. 6589.
- RUMEX BUCEFALOPHORUS L. ssp. GRAECUS.- (Steinh) Rech. Fil.- Muy abundante. Floración mediados de Mayo y Junio. Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. Sierra del Cujón (16) Molata del Imperio (20). R. 6639.
- SANGUISORBA MINOR ssp. MAGNOLII (Spach) Briq.- Abundante sobre prados de anuales. Floración Abril. Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 6637.
- SAPONARIA OCYMOIDES L.- Frecuente en prados. Floración en Abril. Cañada de los Mojones (3) (10). WH 48-55. R. 9084.
- SAXIFRAGA CARPETANA Boiss. et Reuter.- Floración en Abril. Muy común en zona de prados de anuales. Cañada de los Mojones (3) (10). WH 48-55. Frecuente en otros puntos de sierras adyacentes. R. 6595.
- SENECIO MINUTUS (Cav) DC.- Endemismo muy abundante sobre prados de anuales. Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. Los Voladores (20). (Molata) WH 47-44. Floración Mayo a primeros de Junio. R. 6642.
- SESAMOIDES CANESCENS (L.) Kuntze var. canescens.- Muy abundante. Floración a finales de Abril-Mayo. Cañada de los Mojones (3). U.T.M. 30S WH 48-55. R. 6613.
- SESELI MONTANUM ssp. GRANATENSIS (Willk.) Pardo.- Escasa. Forma parte de la floración de Septiembre, sobre prados y pedregales. Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. El Paralcjo (6). (El Pardal) WH 62-60. R. 6598.
- SHERARDIA ARVENSIS L.- Muy común. Floración Abril-Mayo. Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 6636.
- SILENE COLORATA var. angustifolia (Wk) Poir.- Floración Junio. Abundante en las zonas de prados de pino laricio, y de **Juniperus hemisphaerica** ssp **nana**. Cañada de los Mojones (3) (10). WH 48-55. R. 6622.
- SILENE PSAMMITES L.K. var. lasiostyla.- Frecuente. Floración Junio. Sobre prados solcados. Cañada de los Mojones (10). WH 48-55. R. 6653.