



Figura 16. CNV

### Criterios de determinación

Especie de tamaño medio. Forma externa ovalada a subpentagonal, redondeado por delante y estrechado por detrás, deprimido con márgenes redondeados. Cara superior uniformemente convexa, con ambulacros que apenas sobresalen de la superficie. Cara inferior plana, aunque sensiblemente cóncava en las proximidades del peristoma.

Sistema apical subcentral, monobasal, con 4 gonoporos.

Ambulacros petaloides, largos, aproximándose mucho al margen, abiertos en su parte distal. Ambulacro impar algo más corto que el resto. Ambulacros pares anteriores muy divergentes y algo más cortos que los posteriores. Zonas poríferas estrechas, con poros conjugados y desiguales: los internos redondeados, los externos alargados en forma de coma.

Tubérculos pequeños, escrobiculados, densamente distribuidos por toda la superficie, en especial en las proximidades del ámbito.

Peristoma pentagonal, muy ligeramente excéntrico hacia delante aunque menos que el sistema apical, con floscela atenuada.

Periprocto inframarginal, situado en posición muy cercana al borde y ovalado transversalmente.

Posición estratigráfica: Mioceno Medio.

Localidad: Pozo Cañada.

*Echinolampas labrieri* (Lambert, 1915) (Figura 17.)

1915 *Echinolampas labrieri* Lambert, Vol. 69, pl. IV, figs. 8-10.

1995 *Echinolampas labrieri* Lambert; Santolaya y Sillero, III, Fasc. 4, 118, pp. 32-33.