



Figura 18.

CJLG

Criterios de determinación

Especie de tamaño mediano, con planta subcircular, ligeramente más largo que ancho y con margen delgado. Cara superior subcónica y con ápex ligeramente excéntrico hacia delante coincidente con el sistema apical. Cara inferior algo cóncava en la proximidad del peristoma.

Sistema apical excéntrico hacia la parte anterior, monobasal y con 4 gonoporos.

Ambulacros discretamente anchos, petaloideos, casi superficiales y desiguales: el par posterior más largo que el resto y ambulacro impar algo más delgado. Zonas poríferas algo deprimidas y compuestas por pares de poros conjugados y poco desiguales.

Tubérculos escrobiculados, densamente dispuestos por toda la superficie. Peristoma excéntrico hacia delante, rodeado de una ligera floscela.

Periprocto inframarginal, muy cercano al borde, subtriangular, transverso y amplio.

Posición estratigráfica: Mioceno Medio.

Localidad: Pétrola.

Echinolampas (Hypsoclypus) semiglobus (Figura 19)

Criterios de determinación

Especie de gran tamaño. Planta subcircular, con márgenes agudos. Cara superior alta, acampanada y moderadamente cónica. Cara inferior plana. Ápex central.

Sistema apical central, a modo de botón sobresaliente, monobasal, con 4 gonoporos.