

Tabla 1.- Número total de especies y porcentajes en la España continental, y las provincias de Albacete, Murcia y Alicante.

Familias	España continental	Albacete	%	Murcia	%	Alicante	%
<i>Axiidae</i>	1	1	100,00	1	100,00	1	100,00
<i>Drepanidae</i>	17	3	17,65	3	17,65	3	17,65
<i>Geometridae</i>	601	210	34,94	198	32,95	166	27,62
Total	619	214	34,57	202	32,63	170	27,43

7.2 ANÁLISIS BIOGEOGRÁFICO

7.2.1 DISTRIBUCIÓN BIOGEOGRÁFICA MUNDIAL

Entre los heteróceros de Albacete estudiados en este trabajo, predominan los elementos atlanto-mediterráneos (44,76 %), seguido de los asiático-mediterráneos (22,86 %). El resto se encuentra por debajo de estos valores, destacando la presencia de elementos endémicos (6,67 %).

Tabla 2.- Número total de especies y porcentajes distribuidos por elementos faunísticos de los Axiidae, Drepanidae y Geometridae de la provincia de Albacete. Nomenclatura: **ASM:** Asiático-mediterráneo; **AM:** Atlanto-mediterráneo; **E:** Europeo; **END:** Endémico; **EU:** Euroasiático; **G:** Geopolita; **H:** Holártico; **P:** Paleártico.

Familias	AM	ASM	EU	P	END	E	G	H	Total
<i>Axiidae</i>	1 (44,39 %)	0	0	0	0	0	0	0	1 (100 %)
<i>Drepanidae</i>	0	1 (33,33 %)	1 (33,33 %)	1 (33,33 %)	0	0	0	0	3 (100 %)
<i>Geometridae</i>	94 (44,76 %)	48 (22,86 %)	23 (10,95 %)	22 (10,48 %)	14 (6,67 %)	4 (1,90 %)	3 (1,43 %)	2 (0,95 %)	210 (100 %)

La influencia de los elementos citados se corresponde con la posición geográfica de la Península Ibérica, en el extremo suroccidental del continente euroasiático.

7.2.2 DISTRIBUCIÓN BIOGEOGRÁFICA PROVINCIAL

En lo que se refiere a la distribución biogeográfica provincial, de las 214 especies censadas, 180 lo hacen en la Provincia Bética (84 %), 82 en la M-I-C (38 %), 59 en la M-AL (28 %), 59 en la C-P-B (28 %) y 75 en la L-EX (35 %).