

subcentral. Filodios presentes. Periprocto de posterior a inframarginal, circular y pequeño.

Género *CLYPEOPYGUS* (d'Orbigny, 1856)

Especie tipo: *Clypeus paultrei* (Cotteau, 1851).

Características. Todas las placas ambulacrales con dobles poros.

Periprocto supramarginal. Burletes desarrollados. Ausencia de poros bucales.

Clypeopygus sp. (Figura 21.)




Figura 21. CSM

Criterios de determinación

Especie de tamaño pequeño. Cara superior ligeramente abombada, con márgenes redondeados. Cara inferior cóncava.

Sistema apical sensiblemente excéntrico hacia delante, tetrabasal y con cuatro gonoporos.

Ambulacros petaloídes, cortos y superficiales.

Peristoma subpentagonal y excéntrico hacia delante.

Periprocto supramarginal, amplio y ovalado longitudinalmente.

Posición estratigráfica: Cretácico Inferior.

Localidad: Alpera.

Familia PYGAULIDAE (Lambert, 1905)

Características. Sistema apical tetrabasal, con 4 gonoporos. Peristoma oblicuo a lo largo del eje 2-V, burletes ausentes y filodios ligeramente desarrollados careciendo de poros bucales. Pétalos ligeramente desarrollados.

Género PYGOPISTES (Pomel, 1883)

Características. Caparazón subglobular con base plana, solo ligeramente deprimida a nivel del peristoma.