

a nivel de la mitad superior pasando a pares oblicuos hasta el ámbito. Interambulacro posterior ligeramente carenado. Plastron meridosterno.

Tubérculos pequeños, irregular y espaciadamente dispuestos por toda la superficie excepto en las placas ambulacrales periplastronales.

Peristoma ovalado, situado en el tercio posterior.

Periprocto redondeado u ovalado, inframarginal, en contacto con el borde posterior.

Observaciones

Muchos de los ejemplares de *Echinocorys* recogidos en Letur muestran una gran variabilidad gradacional: desde planta ovalada a subpentagonal, forma externa cónica a globular, etc., pero los límites entre especies diferentes son ambiguos, con especies diferenciadas únicamente en el tamaño o forma pero no en diferencias estructurales. Es por lo que especies como *E. ovatus*, *E. semiglobus*, *E. conoideus*, *E. humilis* y *E. tercensis* son tratadas como sinónimos.

Posición estratigráfica: Cretácico Superior (Maastrichtiense).

Localidad: Cortijo de Sorbas (Letur).

Subfamilia PSEUDOHOLASTERINAE (Smith y Jeffery, 2000)

Características. Forma acorazonada con surco frontal más o menos patente. Plastron meridosterno o aproximándose a protosterno con placa esternal triangular en contacto con la primera placa post-esternal a la derecha del margen del plastron.

Género HEMIPNEUSTES (L. Agassiz, 1836)

Especie tipo. *Spatangus striatoradiatus* (Leske, 1778)

Características. Superficie inferior prácticamente lisa con 2 ligeros espolones subanales. Sistema apical alargado con 4 gonoporos. Las placas genitales G2 y G3 y las oculares II, III y IV comúnmente están perforadas por hidroporos. Plastron formado por placas alternantes de forma cuneiforme.

Hemipneustes striatoradiatus* var. *conica (Leske, 1778) (Figura 25.)

1853 *Hemipneustes striato-radiatus* (Leske); d'Orbigny, pls. 802-803.

1875 *Hemipneustes striatoradiatus* (Leske); Cotteau, p. 654.

1875 *Hemipneustes leymeriei* Hébert, p. 594, pl. 20.

1892 *Hemipneustes leymeriei* Hébert; Nicklés, p. 110.

1907 *Hemipneustes leymeriei* Hébert; Lambert, p. 709.

1934 *Hemipneustes striatoradiatus* (Leske); Tzankov, p. 213.

1935 *Spatagoides striatoradiatus elevatus* Smiser, p. 71, pl. 8, fig. 1e.

1935 *Spatagoides striatoradiatus conicus* Smiser, p. 71, pl. 8, fig. 1g.