

del ambulacro impar. Cara posterior truncada verticalmente.

Sistema apical subcentral, holasteroideo, con 4 gonoporos, siendo frecuente que, además de la G2, la placa genital G3 y las oculares II, III y IV presenten hidroporos.

Ambulacros pares subpetaloides, flexuosos y superficiales, aunque la serie posterior de cada uno de ellos se presenta ligeramente deprimida. Zonas poríferas de cada ambulacro muy desigualmente desarrolladas: la serie de poros anteriores formada por pequeños poros redondos; la serie posterior formada por 2 filas de poros desiguales, en la más posterior claramente alargados y en la más anterior redondeados. Zona interporífera amplia. Ambulacro impar alojado en un surco amplio, poco profundo en la parte alta pero que va profundizando a medida que nos acercamos al ámbito, recto, con poros redondeados y pequeños que se distancian a medida que se aproximan al peristoma.

Plastron protosterno con placa labral extendiéndose hasta la segunda esternal.

Peristoma semilunar, situado en el cuarto posterior de la cara oral, labiado y alojado en el fondo de una profunda depresión en la base del surco anterior.

Periprocto redondeado, supramarginal, alojado en la parte alta de una concavidad que deforma la cara posterior.

Ausencia de fasciolas.

Posición estratigráfica: Cretácico Superior (Maastrichtiense).

Localidad: Cortijo de Sorbas (Letur).

2.11 Orden SPANTAGOIDA (Claus, 1876)

Características. Equinoideos irregulares con sistema apical compacto y sin placa genital 5. Peristoma anterior. Periprocto sobre la superficie posterior que aparece truncada. Plastron anfishterno o, más raramente, meridosterno.

Suborden MICRASTERINA (A.G. Fischer, 1966)

Familia MICRASTERIDAE (Lambert, 1920)

Características. Sistema apical etmofracto o transicional con 4 o, más raramente 3 gonoporos. Plastron mesanfishterno.

Género MICRASTER (L. Agassiz, 1836)

Especie tipo. *Spatangus coranguinum* (Leske, 1778)

Características. Equínidos con forma acorazonada y con surco frontal. Sistema apical etmofracto con 4 gonoporos. Ambulacros petaloides hundidos. Fasciola súbana normalmente presente.

Micraster aturicus (Seunes, 1891) (Figura 26.)

1891 *Micraster aturicus* Seunes. p.30, pl. 4, fig. 1; pl. 5, fig. 1

1892 *Micraster aturicus* Seunes; Nickél, p. 110.