

1979 *Micraster aturicus* Seunes; Gongazde, tables 1-2.

2000 *Micraster aturicus* Seunes; Smith y Jeffery, p. 298, fig. 125.

1996 *Micraster aturicus* Hébert; Sillero y Santolaya, VI, Fasc. 5, 207, pp. 69-70.



Figura 26.

CFN

Criterios de determinación

Tamaño bastante grande, aspecto externo acorazonado. Cara aboral bastante convexa y gibosa. Cara oral plana aunque abultada a nivel del plastron y deprimida en el surco anterior hasta el peristoma. Cara anterior dilatada y truncada oblicuamente. Cara posterior truncada con cierto declive hacia adentro.

Sistema apical muy ligeramente excéntrico hacia delante, etmofracto, con 4 gonoporos.

Ambulacros petaloides excavados en la superficie. Ambulacro impar con zonas poríferas compuestas por pares de poros conjugados, redondeados y espaciados, poco visibles debido a la granulación que los recubre, alojado en el surco anterior claramente visible desde el sistema apical hasta la boca. Ambulacros pares relativamente cortos, los posteriores algo más cortos que los anteriores con pares de poros conjugados alargados transversalmente, subvirgulares y desiguales. Zonas interporíferas estrechas, subdivididas y fuertemente deprimidas.

Plastron mesanfisterno.

Tubérculos crenulados, perforados, escrobiculados y muy abundantes por toda la superficie, aunque son más gruesos en la cara inferior. Granulación fina y densa, tendiéndose a agrupar en círculos alrededor de los tubérculos.

Periprocto subcircular emplazado en la parte alta de la cara posterior.

Peristoma subcircular, labiado y dispuesto en el margen de la cara oral.

Presencia de fasciola subanal.