



Figura 27. *Cyclaster heberti* CFN. A. Sistema apical; B. Sistema apical-plumilla; C. Fasciolas peripetalifera y subanal-plumilla.

fila más externa algo más alargados. Ambulacro anterior, sin llegar a mellar el borde, con poros redondos y dispuestos algo oblicuamente. Plastron mesanfisterno.

Tubérculos primarios grandes, escrobiculados, dispersos, disponiéndose sobre todo alrededor de los ambulacros, márgenes y cara oral; en la zona del plastron adoptan una disposición regular en filas convergiendo en la parte más aguda. Tuberculización fina abundante.

Peristoma anterior, semicircular y con labio grande y estrecho.

Periprocto ovalado, situado en la parte alta de la cara posterior, justo donde acaba la quilla, que recorre longitudinalmente la mitad posterior de la cara aboral.

Fasciola peripetalifera incompleta en la parte anterior, y subanal.

#### Observaciones

Tradicionalmente, la especie en cuestión ha sido incluida dentro del género *Isopneustes* pero las características generales de este son similares al género *Cyclaster* descrito con anterioridad por Cotteau, por lo que se encuadra dentro de este último.

Posición estratigráfica: Cretácico Superior (Maastrichtiense).

Localidad: Cortijo de Sorbas (Letur).