

Suborden HEMIASTERINA (Fischer, 1966)

Características. Ambulacros pares petaloídes y ambulacro impar con pares de poros alargados adapicalmente.

Familia SCHIZASTERIDAE (Lambert, 1905)

Características. Forma acorazonada. Ambulacros pares petaloídes. Sistema apical etmolítico con 3 o 4 gonoporos. Peristoma labiado. Presencia de fasciola peripetalífera y generalmente latero-anal.

Género SCHIZASTER (L. Agassiz, 1836)

Características. Forma externa ovalada. Sistema apical anterior, etmolítico, con 2 gonoporos. Ambulacros pares ligeramente curvados y ambulacro impar recto y fuertemente hundido. Presencia de fasciola peripetalífera y latero-anal.

Schizaster cf. scillae (Desmoulins, 1837) (Figura 28)

1837 *Schizaster scillae* Desmoulins.

1999 *Schizaster* aff. *scillae* Cotteau; Sillero y Santolaya, VIII, Fasc. 15-16, 292, pp. 13-14.



Figura 28. CER

Criterios de determinación

Especie de tamaño medio, con su máxima anchura a nivel medio. Cara superior fuertemente marcada por los profundos surcos ambulacrales, con quilla patente a nivel de la parte posterior del interambulacro impar. Cara inferior plana. Cara anterior con surco muy ancho, profundo y acusado que mella el ámbito. Cara posterior truncada verticalmente con inclinación hacia atrás.