

divergiendo entre 70 y 75°. Ambulacro impar ancho y profundo, mellando sensiblemente el margen. Zonas poríferas de ambulacros pares con poros ovalados y conjugados.

Peristoma situado en el 1/4 anterior, de forma arriñonada y fuertemente labiado.

Periprocto ovalado longitudinalmente, alojado en la parte alta de la cara posterior.

Fasciola peripetalífera sinuosa, próxima a los extremos de los pétalos. Fasciola latero-anal presente.

Posición estratigráfica: Mioceno Medio.

Localidad: Sierra del Mugrón (Almansa).

Familia PERICOSMIDAE (Lambert, in Doncieux, 1905)

Características. Espatangoides con forma acorazonada. Ambulacros pares petaloídes. Sistema apical etmolítico con 2, 3 o 4 gonoporos. Peristoma labiado. Presencia de fasciola peripetalífera y marginal.

Género PERICOSMUS (L. Agassiz, 1847)

Características. Sistema apical con tres o cuatro gonoporos. Fasciola peripetalífera sinuosa y fasciola marginal pasando por debajo del periprocto.

Pericosmus aff. *montevalensis* (Von Schaueroth, 1865) (Figura 30)

1865 *Pericosmus montevalensis* Von Schaueroth.

1994 *Pericosmus montevalensis* Von Schaueroth; Sillero y Santolaya, VI, Fasc. 5, 229 bis, pp. 86-87.



Figura 30.

CFN

Criterios de determinación

Equínido de mediano tamaño, forma externa subcordiforme, subhexagonal. Dilatado en su parte anterior, más estrecho por detrás y con su