

Periprocto muy grande, oval ocupando gran parte de la cara posterior. Fasciola peripetalífera fina circunscribiendo los ambulacros y los tubérculos gruesos de la cara superior. Fasciola subanal más ancha y cordiforme.

Posición estratigráfica: Eoceno.

Localidad: Cortijo de Sorbas (Letur).

Eupatagus gibretensis (Tournouër, 1883) (Figura 32)

1886 *Euspatangus gibretensis* Tournouër; Cotteau, Tome I, p. 65, pl. 16.

1890 *Euspatangus gibretensis* Tournouër; Cotteau, p. 10-11, pl. 1, figs, 11-14.

1995 *Euspatangus gibretensis* Tournouër; Sillero y Santolaya, IV, Fasc. 4, 137, pp. 83-84.




Figura 32

CFN

Criterios de determinación

Especie de mediano tamaño. Forma externa ovoide, alargada y subcordiforme. Cara superior suavemente abombada y con márgenes redondeados. Cara inferior casi plana aunque sensiblemente carenada en la zona plastronal. Cara anterior con surco frontal ancho y muy atenuado en el margen siendo en la cara superior inexistente. Cara posterior truncada verticalmente con ligero declive hacia delante.

Sistema apical algo excéntrico hacia delante, etmolítico, con 4 gonoporos.

Ambulacro impar con poros pequeños, simples, distanciándose a medida que se alejan de la cúspide. Ambulacros pares petaloides, acuminados y cerrados en su parte distal; los anteriores son muy divergentes (aproximadamente 160°) y ligeramente más cortos que los posteriores que forman un ángulo aproximado de 45° . Zonas poríferas ligeramente deprimidas y compuestas por poros conjugados ovales, los externos algo más alargados. Zona interporífera ancha y débilmente abombada.

Tubérculos de dos tipos: los primarios muy desarrollados, mamelonados, perforados, crenulados, fuertemente escrobiculados que guarnecen los interambulacros superiores a excepción del posterior que carece de ellos; los