

Criterios de determinación

Tamaño grande, no excesivamente alto y de contorno pentagonal. Margen relativamente grueso. Cara inferior plana, con infundíbulo ancho y profundo.

Sistema apical central, con 4 gonoporos.

Ambulacros petaloídes, largos, el anterior algo más largo que los laterales y posteriores, todos abultados y prominentes y ligeramente abiertos en su parte más distal.

Tubérculos escrobiculados e irregularmente distribuidos por toda la superficie.

Peristoma central.

Periprocto circular y pequeño.

Posición estratigráfica: Mioceno.

Localidad: Letur.

II.- Grupo del *Clypeaster breunigi*.

Caracterizados por su altura no muy elevada, ambulacros cortos y margen muy delgado. Presentan cara inferior plana e infundíbulo pequeño.

***Clypeaster folium* (Agassiz, 1847) (Figura 39)**

Figura 39.

CER

Criterios de determinación

Los ejemplares recogidos en la sierra del Mugerón muestran un tamaño muy grande para la especie, que, por lo general, suele tener un tamaño mucho menor. Planta pentagonal, con bordes muy finos. Cara superior suavemente convexa y ligeramente acampanada en la zona ambulacral. Cara inferior plana con infundíbulo pequeño y surcos ambulacrales muy patentes.