

*Koinodrillus georgii***Material estudiado** (Fig. 4):Zona NE.- **N16**: 1SMZona SW.- **S21**: 1M**Biología y hábitat.**- Es un taxón higrófilo, perteneciente a la categoría ecológica de las epiendogeas. Se encuentra preferentemente en bordes de río, choperas en arroyos y prados. Altitud media a media-alta.*Koinodrillus roseus***Material estudiado** (Fig. 4):Zona NE: **N1**: 1I. **N2**: 2SM, 2I. **N3**: 1SM, 7I. **N4**: 2I. **N5**: 1I. **N6**: 1M, 4SM, 4I. **N7**: 1SM. **N9**: 1SM. **N10**: 1I. **N11**: 2I. **N12**: 1M, 1SM, 2I. **N13**: 9M, 6SM. **N14**: 1M, 1SM. **N15**: 5SM, 5I. **N16**: 11M. **N17**: 1M. **N18**: 2M, 3I. **N19**: 1M.Zona SW.- **S1**: 2M. **S3**: 1SM, 2I. **S4**: 2SM, 1I. **S5**: 1I. **S6**: 2I. **S7**: 1M, 2I. **S10**: 4I. **S16**: 1M, 3I. **S18**: 2M, 5SM, 9I. **S19**: 1I. **S20**: 3M, 2I. **S21**: 2SM. **S22**: 2M, 39I.**Biología y hábitat.**- Especie poliploide y partenogenética, neutrófila y relativamente acidotolerante. Pertenece a la categoría de las endogeas. Se encuentra en multitud de hábitats y a cualquier altitud, pero particularmente abundante en bosques de pinos, de encinas, de algarrobos y mixtos, barrancos, campos de cultivo, cañaverales y prados.**Fig. 4.** Distribución de *K. georgii* y *K. roseus*