

Peristoma central y pentagonal.

Periprocto pequeño redondeado y situado muy cerca del margen.

Posición estratigráfica: Mioceno Medio.

Localidad: Pozo Cañada.

III.- Grupo del *Clypeaster altus*.

Caracterizados por su tamaño grande, con la cima convexa-piramidal.
Ambulacros anchos y largos, más o menos abultados, margen redondeado.

Clypeaster aff. *altus* (Klein, 1778) (Figura 42)

1861 *Clypeaster pyramidalis* Michelin, p. 124-125, pl. 27, figs. a-e.

1913 *Clypeaster altus* Klein var. *pyramidalis* Michelin; Cottreau, p. 61, 148-149, 190, pl. 9, fig. 6 ; pl. 10, fig. 3.

1931 *Clypeaster pyramidalis* Michelin; Lambert, p. 45-46.

1933 *Clypeaster pyramidalis* Michelin; Lambert, p. 10-11.

1938 *Clypeaster pyramidalis* Michelin; Poljak, p. 187, 201, 338, pl. 7, figs. 1-1a.

1941 *Clypeaster pyramidalis* Michelin; Meznerics, p. 89, pl. 2, fig. 8.

1970 *Clypeaster* aff. *portentosus pyramidalis* Michelin; Montenat y Roman, p. 106-107.



cil.

