



Figura 44.

Criterios de determinación

Equínido de tamaño grande. Planta pentagonal, con borde fino. Cara superior fuertemente acampanada casi desde el borde.

Sistema apical pequeño, situado en posición central y monobasal.

Ambulacros petaloídes, muy largos, sensiblemente anchos y algo abombados. Zonas poríferas con pequeños poros redondeados y conjugados.

Peristoma central, pentagonal, alojado en el infundíbulo.

Periprocto pequeño, redondeado y dispuesto muy cerca del margen.

Posición estratigráfica: Mioceno Medio.

Localidad: Pozo Cañada.

Suborden LAGANINA (Mortensen, 1948)

*Características.* Clypeasteroideos con zonas interambulacrales estrechas finalizando adapicalmente en una o más placas simples, periprocto oral, generalmente abriéndose entre el primer y el segundo par de placas basicoronaes.

Familia FIBULARIIDAE (Gray, 1825)

*Características.* Forma variable. Pétalos abiertos con pares de poros no conjugados y redondeados. Surcos de alimentación ausentes. Presencia de refuerzos internos.

Género ECHINOCYAMUS (Van Phelsum, 1774)

*Características.* Caparazón con forma ovalada y aspecto deprimido.

Sistema apical con cuatro gonoporos. Periprocto entre el primer y segundo par de placas coroneas.