

*Echinocyamus pusillus* Muller, 1776. (Figura 45)




Figura 45.

Criterios de determinación

Especie de tamaño muy pequeño, no sobrepasando los 5 mm. Forma externa ovalada y deprimida, presentando bordes muy redondeados. Ausencia de tabiques internos.

Sistema apical central con cuatro gonoporos.

Ambulacros cortos, abiertos distalmente y generalmente poco definidos. Poros ambulacrales redondeados, muy pequeños y no conjugados.

Peristoma central y redondeado.

Periprocto pequeño, de aspecto redondeado y a mitad de camino entre el borde posterior y el peristoma.

Endoesqueleto constituido por 5 pares de tabiques radiados, situados en las zonas ambulacrales.

Posición estratigráfica: Mioceno Medio.

Localidad: Pozo Cañada y Pétrola (CJL).

Infraorden SCUTELLIFORMES (Haekel, 1896)

*Características.* Clypeasteroideos con placas interambulacrales biseriadas hasta el ápex. Músculos de la linterna ensamblados a cinco estructuras interradales fusionadas.

Superfamilia SCUTELLIDEA (Gray, 1825)

*Características.* Surcos alimenticios bifurcados.

Familia SCUTELLIDAE (Gray, 1825)

*Características.* Cuatro gonoporos. Pétalos muy desarrollados. Ausencia de lunulas.

Género PARASCUTELLA (Durham, 1953)