


*Breynella vassali* (Wright, 1855) (Figura 49)

Figura 49. *Breynella vassali*, C.J.L.G. A. Poros genitales y ambulacros; B. Expresión del dimorfismo sexual apreciándose en el individuo hembra el marsupio sobre la cara aboral, contrariamente al macho que no presenta tal hendidura incubatriz.; C. Detalle zonas poríferas ambulacro I.

### Criterios de determinación

Equínido de tamaño pequeño. Planta subpentagonal alargada. Cara superior muy suavemente convexa, casi plana con declive acusado hacia la parte posterior y presentando bordes redondeados. Cara inferior plana aunque ligeramente deprimida en las proximidades del peristoma. Cara anterior sin surco frontal. Cara posterior sensiblemente estrechada.

Sistema apical ligeramente excéntrico hacia delante, monobasal y con 3 grandes gonoporos (falta gonoporo en la placa genital anterior izquierda, G3).

Ambulacros rectos, abiertos en su parte distal, con zonas poríferas formadas por pares de poros redondeados y no conjugados.

Peristoma pentagonal, ligeramente excéntrico hacia delante, con floscela desarrollada.

Periprocto subcircular o ligeramente alargado longitudinalmente y dispuesto de manera submarginal.

### Observaciones

Los ejemplares recogidos denotan un claro dimorfismo sexual (Fig. B) en el que las hembras presentan aboralmente un surco longitudinal hundido