

Usos en otras áreas: en el Habla Local de Cardenete, localidad de la Serranía Baja de Cuenca (Cócera, 2007) se define serrana como “*caracol blanco, de tamaño como una nuez, que se cría en el monte, entre piedras, romeros y sabinas. Es de sabor muy agradable y muy apreciada*”.

En la comarca alicantina de l’Alcoiá (Barber et al., 2005) son muy apreciados y buscados.

Especie muy apreciada por su sabor, atribuido a una alimentación basada en plantas aromáticas como tomillo y romero. El exceso de recolección ha determinado un descenso importante en sus poblaciones, por lo que se está trabajando en desarrollar la cría comercial de esta especie (Muñoz, 2005).

En Albacete son muy buscados y apreciados. Se consumen tradicionalmente en arroz, incluso existe un pequeño comercio con esta especie, destinado a bares y restaurantes que lo ofrecen como una exquisitez, llegándose a pagar a los recolectores cada caracol a 1 €. Este afán de recolección pone en peligro sus poblaciones, localizadas por gran parte de la provincia, pero especialmente en su mitad oriental. Esta especie, según las apreciaciones de nuestros informantes, se halla en clara regresión por un exceso de recolección (Verde y Fajardo, 2007).

El género *Iberus* es un género endémico de la Península Ibérica. Estos caracoles se encuentran amenazados en distinto grado debido a su baja tasa reproductiva, alta mortalidad en sus primeros estadios, la climatología extrema de su hábitat y, muy especialmente, por la recolección abusiva (Navarro, 1991 y Arrébola, com. pers.).

Observaciones: en septiembre de 2007, la Oficina Comarcal Agraria de Yeste organizó un curso sobre la cría, explotación y puesta en valor del caracol serrano, destinado a un público amplio y dirigido por profesionales y expertos de reputada experiencia en este campo. Entre otros temas, se abordó la posible cría de esta especie y su interesante biología (El Portalico, 2007).

La “chapa” (*Iberus gualtieranus*) es un caracol endémico de zonas áridas y secas del sureste ibérico, originario de la Sierra de Gádor (Almería) e introducido en otras sierras andaluzas sin llegar a estar presente en la provincia de Albacete. De forma muy aplanada y concha surcada de pequeños pliegues, se considera que puede tratarse de una forma adaptada para refugiarse entre piedras y en grietas, aunque estudios recientes han confirmado su separación como especie del *Iberus alonensis* (Elejalde et al. 2005, 2008). Se considera la joya de la malacología ibérica y un caracol popularmente muy valorado y perseguido lo que se ha traducido en un gran descenso de sus poblaciones. Debido a este hecho, en su área de distribución