

se han establecido diversas medidas para garantizar su conservación como prohibición de su captura y proyectos de cría en cautividad, como los que actualmente se desarrollan dentro del Programa de Actuaciones para la Conservación y Uso Sostenible de los Caracoles de Andalucía (Arrébola, com. pers.).

### *Otala lactea* (Müller)

Nombres locales: **boquinegros, cabrillas**

**Descripción:** caracol grande, de hasta 35 mm. de diámetro. Espiral aplanada. Abertura con el borde del labio negro. A menudo presenta un diseño barrado, con largas líneas longitudinales oscuras. La característica principal que diferencia las especies del género *Otala* del resto de caracoles consumidos es el color negro de su manto, muy evidente, sobre todo cuando están dentro de la concha

**Hábitat:** vegas y zonas frescas con abundante vegetación. Especie termófila, propia de comarcas cálidas. En Albacete se consumen procedentes de circuitos comerciales que los importan de Marruecos.

**Época de recolección:** primavera.

**Forma de consumo:** principalmente en arroz o también en salsa con hierba caracolera. Uso vigente.

**Usos en otras áreas:** los caracoles del género *Otala* son muy apreciados gastronómicamente y se comercializan en el mercado internacional (Navarro, 1991).

### *Otala punctata* (Müller)

Nombres locales: **barbachos, boquinegros, cabrillas, caracol gordo de huerta**

**Descripción:** caracol grande, de hasta 40 mm. de diámetro. Espiral aplanada. Abertura con el borde del labio blanquecino. La característica principal que diferencia esta especie de otros caracoles consumidos es el color negro de su manto, muy evidente, sobre todo cuando están dentro de la concha

**Hábitat:** vegas y zonas frescas con abundante vegetación. Común.

En la comarca de Almansa, se presenta esta especie en ambientes de cierta humedad (Robles et al., 1991).

**Época de recolección:** primavera.

**Forma de consumo:** principalmente en arroz o también en salsa con hierba caracolera. Uso vigente.

**Usos en otras áreas:** especie propia del cuadrante nororiental de la Península Ibérica, diferenciándose de la especie próxima *Otala lactea* por