

el color del labio, negro en esta especie y blanquecino en *O. punctata*, por su tamaño, generalmente menor en *Otala lactea* y por su distribución, más meridional en el caso de *O. lactea*.

***Sphincterochila candidissima* (Draparnaud)**

Nombres locales: **caracol judío, caracol moro, caracol blanco**

Descripción: caracol mediano (unos 20 mm. de diámetro medio), de concha redondeada, gruesa y dura, totalmente blanca (adaptada para reflejar la luz solar). Cuerpo muy oscuro, casi negro. En condiciones ambientales adversas cierran la abertura con un epifragma calizo, blanco y duro.

Hábitat: matorrales mediterráneos como espartizales y tomillares en zonas secas y áridas. Se alimenta de los líquenes y algas que recubren las piedras. Muy común, excepto en las zonas más húmedas de la provincia y los campos cerealistas.

Citada en la comarca de Almansa. Especie de distribución íbero-magrebí (Robles et al., 1991).

Época de recolección: primavera.

Forma de consumo: principalmente con tomate o en arroz como acompañamiento de otras especies, sobre todo de los caracoles serranos.

No se consume en todas las localidades de la provincia, de forma que en algunos pueblos se recolecta y emplea como alimento y en otros no se considera de valor gastronómico. No se comercializa.

Usos en otras áreas: se consume también en Andalucía, aunque de forma restringida y localizada (Arrébola, 2002).

***Theba pisana* (Müller)**

Nombres locales: **caracol alfalfero, caracol chupalandero, caracol pequeño, caracol de boca roja**

Descripción: caracol pequeño, de unos 20 mm. de diámetro. Concha globosa, de color muy variable, desde prácticamente blanca a profusamente rayada. Sin ombligo o apenas visible. Labio blanco o rosado.

El llamado en Tobarra “caracol de boca roja” creemos que se corresponde a las formas de labio rosado de esta especie, aunque también presenta esta característica otra especie de caracol de pequeño tamaño, *Xerosecta promissa*.

Hábitat: vegetación nitrófila de márgenes de caminos y campos de cultivo. Especie termófila propia de las áreas más cálidas de la provincia, donde convive con *C. virgata*, aunque *T. pisana* es más escasa que esta especie (Robles et al., 1991).

Época de recolección: primavera.