

***Centaurea benedicta* (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 1296 (1763)**

Cnicus benedictus L., Sp. Pl.: 826 (1753) [basiónimo]

Planta anual perteneciente a la familia *Compositae*, con tallos de hasta unos 40 cm de longitud, que en el territorio estudiado crece en cultivos, márgenes de éstos y de caminos, baldíos y barbechos. Se distribuye por el S de Europa, NW de África –Argelia– y W y SW de Asia; naturalizada en diversas regiones como Norteamérica, Sudamérica, S de África y SE de Australia. En la Península Ibérica aparece dispersa, no habiéndose citado de las zonas W y NW más extremas (Devesa *et al.*, 2014: 524; GBIF, 2021). Figuras 6-8.

La adscripción de esta planta al género *Centaurea* L., en vez de a *Cnicus* L., ha sido ratificada por análisis filogenéticos (García Jacas *et al.*, 2000; 2001 y 2006).

Las citas que adjuntamos amplían la distribución conocida de la especie en el territorio estudiado, donde ya fue localizada en las provincias de Albacete y Valencia (Gómez, 2011: 222). Para Albacete la referencia más próxima a la zona de estudio sitúa la especie en Chinchilla (Gandoger, 1917: 170), también ha sido citada en Balazote y Ossa de Montiel por Esteso (1992: 128, 136 y 307), en Yeste por López Vélez (1996: 202), en el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, sin precisar localidad, por Sánchez Gómez *et al.* (2016: 71) y en la cuenca del río Guadalmena por Inocencio *et al.* (1998: 87). En Valencia, uno de nosotros –Laguna, 1987– la localizó en Siete Aguas (*cf.* BDBC-V, 2021) y Mateo (2018) la ha observado en Requena. En la Comunidad Valenciana esta planta está considerada muy rara (Mateo y Crespo, 2014: 158).

A *C. benedicta* se le atribuyen propiedades medicinales (Font Quer, 1962: 857 y 958), si bien en el área de estudio no se le conoce uso alguno.

ALBACETE: 30SXJ5452, 500 m, Balsa de Ves, Lentiscosa. Reguero o pequeña rambla, entre campos de cultivo. Sustrato arenoso y arcilloso. *J. Gómez*, 20-4-2000 (J. GÓMEZ 621). **Ibidem**, 487 m, Balsa de Ves, Lentiscosa. Barbecho junto a camino. *J. Gómez*, 5-5-13 (MA 944180, ALBA 13062, J. GÓMEZ 3093). **VALENCIA: 30SXJ5354**, 395 m, Requena, Loma de Cortaderas. Baldío junto al camino. *A. Navarro, J. E. Oltra, J. Gómez y P. P. Ferrer*, 22-5-10 (v. v.) [Cita indicada en BDBC-V (2019)]. **30SXJ5846**, 722 m, Cofrentes, pr. Inicio del camino asfaltado del Tísico. Barbecho. *J. Gómez*, 30-4-17 (v. v.). **30SXJ5943**, 756 m, Jalance, pr. Casa de los Gabrieles. Barbecho en cultivo de almendro arrancado. *J. Gómez*, 11-5-13 (J. GÓMEZ 3096). **30SXJ6044**, 766 m, Cofrentes, pr. El Cortijillo. Barbecho de cebada sobre suelo arenoso. *J. Gómez*, 10-4-08 (J. GÓMEZ 2414). **30SXJ6446**, 330 m, Cofrentes, Central de Basta. Huerta abandonada. *J. Gómez*, 25-4-09 (MA 944179, VAL 244975, J. GÓMEZ 2604).

Anthos (2021); BDBC-V (2021); Bolòs, O. de y Vigo, J. (1996); Devesa, J. A. *et al.* (2014); Esteso, F. (1992); Font Quer, P. (1962); Gandoger, M. (1917); García Jacas, N. *et al.* (2000, 2001, 2006); GBIF (2021); Gómez, J. (2011); Inocencio, C. *et al.* (1998); López Vélez, G. (1996); Mateo, G. (2018); Mateo, G. y Crespo, M. B. (2014); Sánchez Gómez, P. *et al.* (2016).