

lugares si las condiciones son las apropiadas. El más común de este grupo en la provincia de Albacete ..... ***Boletus aereus***

**20 Género *Imleria***

Cutícula de color marrón oscuro o pardo. Pie sin ningún tipo de ornamentación, de color marrón claro sobre fondo amarillo. Prefiere los terrenos ácidos y las coníferas para su aparición. En la provincia no se conoce su existencia ..... ***Imleria badia***

**21. Géneros *Lanmaoa* y *Hemileccinum***

**21a** Cutícula de color marrón, de tonos oscuros. Carne que al corte azulea, olor agradable, dulzón en todo el carpóforo. Bajo encinas en suelo ácido..... ***Lanmaoa fragrans***

**21b** Cutícula de color ocre, dominan las tonalidades claras en la misma. Carne amarillenta, inmutable al corte. La base del pie tiene un peculiar olor a yodo. Bajo frondosas, indiferente edáfico. Común en la provincia..... ***Hemileccinum impolitus***

**22 Género *Butyriboletus***

**22a** Cutícula de color rosado más o menos fuerte.....23

**22b** Cutícula de otro color .....24

**23a** Cutícula de color rosa vivo. Carne que no azulea al corte. Pie de color amarillo con retículo del mismo color. Aparece bajo frondosas en terreno ácido o neutro. Especie rara e interesante, de momento sin localizar en la provincia ..... ***Butyriboletus regius***

**23b** Cutícula de color pardo rosado, rosa amarronado. Carne que azulea al corte, pie de color amarillo en la parte alta y ocráceo en la base. Especie termófila que aparece bajo frondosas en suelos de toda naturaleza, muy raro ..... ***Butyriboletus pseudoregius***