

Phelipanche resedarum Carlón, G. Gómez, M. Laínz, Moreno Mor., Ó. Sánchez & Schneew. in Documentos Jard. Bot. Atlántico (Gijón) 6: 50 (2008)

Orobanche resedarum (L. Carlón *et al.*) A. Pujadas & Triano in Diversidad vegetal de las yemas ibéricas: 277 (2011)

Planta anual o perenne, perteneciente a la familia *Orobanchaceae*, de hasta unos 30 cm de altura, que en el territorio estudiado es parásita de distintas especies de *Reseda* L. (*Resedaceae*). Hasta hace poco constituía un endemismo del centro de España, habiéndose confirmado su presencia en 6 provincias: Albacete, Cuenca, Madrid, Teruel, Toledo y Zaragoza, aunque probablemente también crezca en Guadalajara (cf. Carlón *et al.*, 2008; Gómez *et al.*, 2013; Sánchez Pedraja *et al.*, 2016). Figuras 13-16.

Según los autores que la describieron, se ha observado como parásita de especies de *Reseda*, especialmente *R. suffruticosa* Loefl. ex Koelp., *R. phyteuma* L. y *R. stricta* Pers. Sin embargo, nuestras observaciones personales por el momento han detectado como plantas huésped a *R. lutea* L. subsp. *lutea* y rara vez a *R. undata* L. y a *R. phyteuma*, nunca a *R. stricta*, a pesar de ser esta última relativamente frecuente en parte del territorio estudiado (*R. suffruticosa* no crece en la zona).

Atendiendo a las citas aportadas *Ph. resedarum* constituye novedad para la provincia de Valencia y por extensión para la Comunidad Valenciana y amplía su distribución en la provincia de Albacete a localidades más orientales anteriormente dadas (cf. Gómez *et al.*, 2013: 84-85).

ALBACETE: 30SXJ3447, 690 m, Casas Ibáñez, Loma de las Muletas. Matorral bajo. J. Gómez, 17-6-08 (v. v.). **30SXJ3648**, 690 m, Alborea, Cerro de las Oliveras. Matorral bajo, parásita de *Reseda lutea* subsp. *lutea*. J. Gómez, 8-6-08 (v. v.). **30SXJ3649**, 690 m, Alborea, pr. Hoyos de la Tierra Blanca. Matorral bajo, parásita de *Reseda lutea* subsp. *lutea*. J. Gómez, 28-5-08 (MA 837618, ALBA 7429, J. GÓMEZ 2491). **Ibidem**, 692 m, Alborea, pr. Hoyos de la Tierra Blanca. Matorral bajo, parásita de *Reseda undata* y *Reseda lutea* subsp. *lutea*. J. Gómez, 31-5-11 (J. GÓMEZ 2868). **30SXJ3746**, 695 m, Alborea, pr. Villar de Gil. Matorral entre cultivos, parásita de *Reseda lutea* subsp. *lutea*. J. Gómez, 17-6-08 (v. v.). **30SXJ3939**, 515 m, Alcalá del Júcar, pr. Fundación de Tolosa. Margen de camino, parásita de *Reseda lutea* subsp. *lutea*. J. Gómez, 29-6-08 (J. GÓMEZ 2572). **30SXJ4017**, 1189 m, Higuera, Punta de Gira Valencia. Cortafuegos en ladera umbrosa junto a quejigar aclarado. Parásita de *Reseda lutea* subsp. *lutea*. J. Gómez, 30-6-10 (J. GÓMEZ 2737) [Cita no indicada en el mapa de localización]. **30SXJ4351**, 720 m, Villatoya- Alborea, Las Muelas. Margen de camino. Parásita de *Reseda lutea* subsp. *lutea* y *R. undata*. J. Gómez, 18-8-20 (v. v.). **30SXJ4831**, 887 m, Carcelén, pr. inicio de la Carretera de la Hunde. Margen de camino. Parásita de *Reseda lutea* subsp. *lutea*. J. Gómez, 20-6-19 (v. v.). **30SXJ5020**, 1019 m, Alpera, El Sej. Junto a camino y zona forestal. Parásita de *Reseda lutea* subsp. *lutea* (flor seca). J. Gómez, 23-7-10 (v. v.) [Cita no indicada en el mapa de localización]. **30SXJ5551**, 520 m, Balsa de Ves, pr. Corral de Caracoles. Cultivo abandonado hace muchos años, labrado hace poco. En suelo yesoso. Parásita de *Reseda phyteuma*. J. Gómez, 26-5-13 (J. GÓMEZ 3116). **VALENCIA: 30SXJ6245**, 561