



Figura 5. Vegetación acuática y marginal de la Laguna de Ontalafia (modificado de Cirujano, 1990).

- Zona lagunar este, junto a las salinas, muy eutrofizada por los aportes orgánicos del ganado que circula por su borde.
 - Zona norte, donde desembocan dos arroyos de agua dulce y su área de influencia en la laguna, donde la salinidad es menor que en el resto de la misma.
 - Charca artificial junto al camino que circunda la laguna, utilizada como abrevadero del ganado y con abundante vegetación marginal y acuática.
- **Laguna de Ontalafia** (Cuenca Hidrográfica del Segura, Albacete) (fig. 4). Laguna endorreica subsalina de aguas permanentes aunque muy fluctuantes y arroyos temporales asociados, que posee unos 500 m de diámetro y 1 m de profundidad media. Predomina *Potamogeton pectinatus*, aunque hacia las orillas aparece también *Cladophora sp.* (fig. 5). Destaca la gran abundancia de anátidas cuyas deyecciones suponen un importante aporte de nutrientes que se une al que recibe a través del vertido de aguas residuales que canaliza un arroyo por la parte sur. Se han muestreado también tres zonas (fig. 5):
 - Zona sur, que recibe aportes de un arroyo que con frecuencia transporta aguas residuales, incluyendo zonas de playa y de vegetación acuática (*Potamogeton pectinatus*).
 - Arroyo sur antes de desembocar en la laguna, cuyo caudal se encuentra contaminado por aguas residuales.