

*Bembidion (Emphanes) minimum* (Fabricius, 1792)

Elemento eurosiberiano. Especie halófila, paludícola; marzo a septiembre. Embalse de Taibilla, Lagunas de Casas del Cerro, Horna, Ontalafia, Pétrola y Salobralejo, Saladar de Cordovilla, Salinas de Pinilla.

*Bembidion (Emphanes) normannum* Dejean, 1831

Elemento mediterráneo etiópico. Especie halófila, paludícola; junio y julio. Lagunas de Alboraj (Tobarra), Patos (Hellín), Pétrola, Saladar y Salobralejo, Saladar de Cordovilla.

*Bembidion (Euperyphus) ripicola* Dufour, 1820

Elemento mediterráneo. Especie ripícola; marzo a agosto. Embalses de Camarillas, Fuensanta y Taibilla.

*Bembidion (Lopha) quadripustulatum* Audinet-Sevilla, 1821

Elemento paleártico occidental. Especie halófila. Embalses de Camarillas y Talave, Lagunas de Casas del Cerro, Casas de Víllora, Pétrola, Ruidera y Sugel, Saladar de Cordovilla.

*Bembidion (Metallina) properans* Stephens, 1828

Elemento eurosiberiano. Especie halófila, paludícola; mayo y junio. Embalses de Almansa y Camarillas, Lagunas de Casas del Cerro, Casas de Víllora, Ontalafia, Pétrola, Ruidera, Saladar y Sugel, Saladar de Cordovilla, Salinas de Pinilla.

*Bembidion (Neja) ambiguum* Dejean, 1831

Elemento mediterráneo occidental macaronésico. Especie higrófila; febrero a mayo y de octubre a noviembre. Embalses de Camarillas y Fuensanta, Lagunas de Ruidera.

*Bembidion (Nepha) callosum subconnexum* De Monte, 1953

Elemento mediterráneo occidental. Especie halófila, ripícola; marzo a julio. Embalse de Taibilla, Laguna de Hoya Rasa y Mojón Blanco.

*Bembidion (Nepha) genei* Kuster, 1847

Elemento mediterráneo. Especie halófila, ripícola; marzo a julio. Embalses de Taibilla y Talave, Lagunas de Casas del Cerro, Salobralejo y Sugel.

*Bembidion (Nepha) grisvardi* Dewailly, 1949

Elemento lionigúrico. Especie ripícola, abril a junio. Embalse de Talave.