

*Poecilus (Carenostylus) purpurascens purpurascens* (Dejean, 1828)

Elemento mediterráneo occidental. Especie halófila; febrero a junio y en noviembre. Embalses de Almansa, Camarillas y Taibilla. Lagunas de Casas de Villora, Horna, Ojos de Villaverde. Pétrola, Ruidera, Saladar y Sugel, Saladar de Cordovilla.

*Poecilus (Macropoecilus) kugelanni* (Panzer, 1797)

Elemento europeo. Especie higrófila y lapidícola; febrero a julio y en noviembre. Embalses de Taibilla y Talave. Lagunas de Arquillo, Corralrubio, Horna y Pétrola, Saladar de Cordovilla, Salinas de Pinilla.

*Poecilus (Poecilus) cupreus* (Linnaeus, 1758)

Elemento eurosiberiano. Especie halófila, paludícola; abril a noviembre. Embalses de Camarillas, Fuensanta, Taibilla y Talave, Lagunas de Arquillo, Corralrubio, Horna, Pétrola, Ruidera, Saladar y Salobralejo, Saladar de Cordovilla.

*Pterostichus (Argutor) vernalis* (Panzer, 1796)

Elemento eurosiberiano. Especie halófila; abril a noviembre. Lagunas de Pétrola, Ruidera, Saladar y Salobralejo.

*Pterostichus (Melanius) aterrimus nigerrimus* Dejean, 1828 (*attenuatus* Chevrolat, 1840)

Elemento paleártico occidental. Especie ripícola y paludícola; enero a julio y en octubre. Embalses de Camarillas y Taibilla, Lagunas del Arquillo y Ruidera, Saladar de Cordovilla.

*Pterostichus (Melanius) elongatus* (Duftschmid, 1812)

Elemento mediterráneo occidental. Especie halófila; junio y octubre. Lagunas del Arquillo y Salobralejo.

*Pterostichus (Pseudomaseus) nigrita* (Paykull, 1790)

Elemento paleártico occidental. Especie halófila y paludícola; marzo a junio, octubre y noviembre. Embalse de Cenajo, Lagunas de Arquillo, Ruidera y Salobralejo, Saladar de Cordovilla.

*Steropus (Sterocorax) globosus ebenus* (Quensel, 1806)

Elemento íbero magrebino. Especie lapidícola; todo el año. Embalse de Taibilla, Lagunas de Ruidera.