

Cuscuta nivea M. A. García in Bot. J. Linn. Soc. 135(2): 171 (2001)

Hierba parásita perteneciente a la familia *Convolvulaceae*, con tallos volubles y muy delgados –no alcanzan 0,5 mm de diámetro–, inflorescencia en glomérulos paucifloros y flores muy pequeñas –hasta de 2,2 mm–, papilosas y blancas, en su mayoría tetrámeras. Se la considera parásita de pequeñas plantas de matorral (cistáceas, labiadas y leguminosas) (cf. Blanca, 2011; García García, 2012). En nuestra zona la hemos visto como parásita de *Fumana ericifolia* Wallr., *Genista pumila* (Debeaux & É. Rev. ex Hervier) Vierh. subsp. *pumila*, *G. scorpius* (L.) DC., *Helianthemum apenninum* subsp. *cavanillesianum* (M. Laínz) G. López, *H. cinereum* subsp. *rotundifolium* (Dunal) Greuter & Burdet, *H. hirtum* (L.) Mill., *Linum suffruticosum* L. subsp. *suffruticosum*, *Lithodora fruticosa* (L.) Griseb., *Salvia lavandulifolia* Vahl subsp. *lavandulifolia*, *Sideritis incana* L., *S. tragoriganum* Lag., *Thymus lacaitae* Pau y *Th. vulgaris* L. subsp. *vulgaris*. Endemismo Íbero-magrebí que en España ha sido citado en varias provincias del E y C peninsular. (cf. García García, 2012). Figs. 11 y 12.

Hasta la fecha no había sido mencionada su presencia en Albacete, por lo que las citas que aportamos constituyen novedad provincial. Aunque no la hemos visto en el territorio estudiado de la provincia de Valencia, es prácticamente segura su presencia, ya que el vallado cinegético de la Muela de Tortosilla no nos ha permitido acceder a una zona limítrofe valenciana con otra de la provincia de Albacete donde sí crece. La única referencia que conocemos de Valencia la sitúa en Castielfabib (Rincón de Ademuz) (Mateo y cols., 2008).

Esta especie fue considerada variedad de *C. planiflora* (cf. Yuncker, 1932), pero distintos caracteres –además de su número cromosómico–, justificarían su reconocimiento y segregación (cf. García García, 2001; García García y Castroviejo, 2003).

ALBACETE: 30SXJ3248, 750 m, Casas Ibáñez, Cerro de San Jorge. Matorral soleado. *J. Gómez*, 26-5-06 (J. GÓMEZ 2095). **30SXJ3747**, 675 m, Alborea, Roba Santos. Matorral umbroso. *J. Gómez*, 30-5-06 (J. GÓMEZ 2103). **30SXJ3748**, 697 m, Alborea, Cerro de las Oliveras. Matorral umbroso. *J. Gómez*, 13-7-13 (v. v.). **30SXJ3846**, 671 m, Alborea, Pr. Corral de Juan Pérez. Matorral umbroso junto a pinar. *J. Gómez*, 13-7-13 (v. v.). **30SXJ3946**, 672 m, Alborea, Pr. Corral de Juan Pérez. Matorral con poca cobertura sobre margas blancas. *J. Gómez*, 13-7-13 (v. v.). **30SXJ4017**, 1225 m, Higuera, Punta de Gira Valencia. Umbría junto a la cumbre con matorral bajo achaparrado. *J. Gómez*, 12-7-13 (J. GÓMEZ 3137) [Cita no indicada en el mapa de localización]. **30SXJ4048**, 704 m, Alborea, Cerro Gordo. Matorral bajo junto a pinar sobre suelo margoso. *J. Gómez*, 6-7-13 (MA 882993, ALBA 7957, J. GÓMEZ 3133). **30SXJ4247**, 698 m, Casas de Ves, Ceja de San Antonio. Matorral umbroso. *J. Gómez*, 13-7-13 (v. v.). **30SXJ4427**, 1060 m, Alpera, Pr. Dehesa Virginia. Matorral bajo en ladera sobre margas poco consistentes. *J. Gómez*, 2-8-13 (v. v.). **30SXJ4448**, 680 m, Casas