

*Harpalus (Harpalus) albanicus* Reitter. 1900

Elemento mediterráneo septentrional. Especie lapidícola; marzo. Laguna del Saladar.

*Harpalus (Harpalus) anxius* (Duftschmid. 1812)

Elemento paleártico occidental. Especie lapidícola: marzo a mayo. Laguna del Saladar.

*Harpalus (Harpalus) attenuatus* Stephens. 1828

Elemento mediterráneo occidental. Lapidícola, mayo. Embalse de Taibilla. Laguna del Salobralejo.

*Harpalus (Harpalus) distinguendus* (Duftschmid. 1812)

Elemento paleártico occidental. Especie halófila y lapidícola: todo el año. Embalses de Almansa. Camarillas. Cenajo. Fuensanta, Taibilla y Talave. Lagunas de Arquillo. Casas de Vállora. Corralrubio. Horna. Ontalafia. Pétrola, Ruidera, Saladar, Salobralejo y S. Benito, Saladar de Cordovilla. Salinas de Pinilla.

*Harpalus (Harpalus) fuscicornis* Ménétríés. 1832

Elemento paleártico occidental. Especie lapidícola: marzo, abril y octubre. Lagunas de Ruidera.

*Harpalus (Harpalus) microthorax* Motschoulski. 1849

Elemento numídico. Especie halófila, lapidícola; enero a junio, octubre y noviembre. Embalse de Almansa. Lagunas de Casas de Vállora, Corralrubio. Horna. Hoya Rasa. Mojón Blanco. Pétrola. Saladar y Salobralejo. Saladar de Cordovilla. Salinas de Pinilla.

*Harpalus (Harpalus) rubripes* (Duftschmid. 1812)

Elemento europeo. Especie lapidícola; abril a junio. Embalses de Taibilla y Talave.

*Harpalus (Harpalus) serripes* Quensel. 1806

Elemento paleártico occidental. Especie lapidícola: marzo y octubre. Embalses de Taibilla y Talave. Lagunas Ontalafia. Ruidera y Salobralejo. Salinas de Pinilla (Serrano et al., 1990).

*Harpalus (Harpalus) sulphuripes sulphuripes* Germar. 1824

Elemento mediterráneo occidental. Lapidícola. Embalse de Almansa.