

*Microlestes corticalis* (Dufour, 1820)

Elemento mediterráneo macaronésico. Especie lapidícola; enero a julio y septiembre. Embalse de Fuensanta, Lagunas de Pétrola, Saladar y Salobralejo, Saladar de Cordovilla.

*Microlestes gallicus* Holdhaus, 1912

Elemento mediterráneo occidental. Especie lapidícola. Lagunas de Pétrola, Saladar y Salobralejo.

*Microlestes luctuosus* Holdhaus, 1912

Elemento paleártico. Especie lapidícola; abril a junio y noviembre. Embalses de Fuensanta y Taibilla, Lagunas de Pétrola y Ruidera.

*Microlestes negrita negrita* Wollaston, 1854

Elemento mediterráneo macaronésico. Especie lapidícola; abril. Lagunas de Arquillo, Pétrola. Saladar y Salobralejo.

*Paradromius (Manodromius) linearis linearis* (Olivier, 1795)

Elemento paleártico occidental. Especie xerófila que se refugia en la vegetación, a veces corticícola; mayo a septiembre. Saladar de Cordovilla.

*Philorhizus insignis* Lucas, 1846

Elemento ibero magrebí. Especie lapidícola y corticícola; enero. Laguna de Pétrola.

*Philorhizus melanocephalus* (Dejean, 1825)

Elemento mediterráneo. Especie lapidícola. Saladar de Cordovilla.

Subtribu Lionychina

*Apristus europaeus* Mateu, 1980

Elemento europeo. Especie lapidícola; mayo a julio. Embalse de Fuensanta.

*Syntomus foveatus* (Geoffroy, 1785)

Elemento paleártico occidental. Especie xerófila y lapidícola; mayo. Embalse de Fuensanta.