

Cuadro 2

Número de especies comunes capturadas e índices de similitud faunística (Jaccard y Czekanowsky) entre lagunas y embalses de Albacete.

LOCALIDADES	ESPECIES COMUNES	I. Jaccard	I. Czekanowsky
Camarillas-Fuensanta	14	0,237	0,383
Camarillas-Talave	20	0,322	0,488
Camarillas-Taibilla	16	0,193	0,323
Camarillas-Horna	11	0,193	0,323
Camarillas-Ruidera	19	0,223	0,365
Camarillas-Pétrola	22	0,216	0,355
Camarillas-Saladar	13	0,164	0,282
Camarillas-Salobralejo	10	0,125	0,222
Camarillas-Cordovilla	27	0,237	0,312
Camarillas-Pinilla	5	0,086	0,137
Fuensanta-Talave	18	0,269	0,423
Fuensanta-Taibilla	19	0,229	0,372
Fuensanta-Horna	7	0,109	0,197
Fuensanta-Ruidera	18	0,202	0,336
Fuensanta-Pétrola	17	0,154	0,268
Fuensanta-Saladar	9	0,104	0,189
Fuensanta-Salobralejo	9	0,107	0,193
Fuensanta-Cordovilla	17	0,134	0,236
Fuensanta-Pinilla	2	0,027	0,053
Talave-Taibilla	24	0,276	0,432
Talave-Horna	9	0,127	0,225
Talave-Pétrola	21	0,183	0,309
Talave-Saladar	10	0,106	0,192
Talave-Salobralejo	11	0,121	0,216
Talave-Cordovilla	32	0,264	0,418
Talave-Pinilla	5	0,062	0,118
Talave-Ruidera	21	0,221	0,362
Taibilla-Horna	15	0,183	0,309
Taibilla-Ruidera	26	0,243	0,391
Taibilla-Pétrola	24	0,182	0,314
Taibilla-Saladar	13	0,120	0,172
Taibilla-Salobralejo	14	0,133	0,235
Taibilla-Cordovilla	30	0,214	0,357
Taibilla-Pinilla	8	0,085	0,157