

son de color rojo ribeteadas por una estrecha línea oscuro-azulada, que a veces puede invadir casi la totalidad del ala, como ocurre en el caso de *Z. lavandulae*. En las superiores predomina el color oscuro-azulado de fondo sobre el que destacan cinco o seis manchas en parte redondeadas, aisladas o solapadas en mayor o menor grado, por lo general rojas en el subgénero *Zygaena*, rojo claro, carmín o anaranjadas en *Mesembrynus* y a veces rodeadas de un círculo blanquecino o cremoso amarillento en *Agrumenia*.




FIGURA N.º 3: Modelo de nerviación y distribución de manchas alares en el género *Zygaena* Fabricius (según Hampson).

El cuerpo se encuentra recubierto de una corta vellosidad sobre la que destaca, en algunas especies, un cinturón abdominal rojo, así como un collar torácico coloreado de blanco o rojo que separa la cabeza del tórax. La presencia de este cinturón abdominal parece ser un signo evolutivo primitivo, que desaparece en las especies más recientes.

Las orugas, de cuerpo corto, grueso y aovado, están recubiertas de pelos cortos de colores verdosos, amarillentos, blancos y negros, presentando un aspecto aterciopelado. Tienen dieciséis patas y la cabeza, negra, es pequeña y redondeada.