

- 1 Con anillo torácico blanco 2
 2 Con anillo abdominal rojo Z. (A) occitanica De Villers, 1789
 2 Sin anillo abdominal rojo Z. (A) hiliaris Ochsenheimer, 1808

Subgénero Zygaena Fabricius, 1775

- 1 Con anillo abdominal rojo 2
 1 Sin anillo abdominal rojo 3
 2 Anillo abdominal rojo, ocupando un segmento y sexta mancha del anverso de las alas anteriores más o menos redondeada Z. (Z) rhadamanthus Esper, 1793
 2 Anillo abdominal rojo, ocupando más de un segmento y sexta mancha de las alas anteriores alargada y unida a la quinta .. Z. (Z) ignifera Korb, 1897
 3 Sin collar torácico 4
 3 Con collar torácico (blanco) Z. (Z) lavandulae Esper, 1783
 4 Alas poco escamadas Z. (Z) nevadensis Rambur, 1866
 4 Alas normalmente escamadas 5
 5 Manchas rojas del reverso alar anterior, aisladas Z. (Z) trifolii Esper, 1783
 5 Manchas rojas del reverso alar anterior, solapadas por una más o menos marcada escamación roja Z. (Z) filipendulae Linnaeus, 1758

V. ESTUDIO DE LAS ESPECIES

Zygaena (Mesembrynus) sarpedon Hübner, 1790

Especie mediterráneo occidental que habita en Francia (desde Normandía hasta la Riviera) y la Península Ibérica.

La oruga, que inverna, se alimenta de umbelíferas del género *Eryngium*, crisalidando en un capullo alargado que fija a las hojas o tallos de la planta nutricia. Hasta la fecha no hemos podido localizar en la zona de estudio ninguno de sus estadios, pudiendo ser *Eryngium campestre* o *Eryngium dilatatum* las plantas que le sirvan de alimento. La referencia más próxima la tenemos en Jumilla