

Ranunculus sceleratus L., Sp. Pl.: 551 (1753)

Planta anual perteneciente a la familia *Ranunculaceae* que en condiciones óptimas supera los 50 cm de altura. De distribución subcosmopolita y dispersa por la Península Ibérica (cf. López González, 1986: 353). En los lugares donde la hemos localizado crece sobre suelo fangoso, encharcado temporalmente. Su cita constituye novedad provincial para Albacete y amplía el área de distribución peninsular de la especie, la cual no había sido citada hasta ahora en nuestra zona de estudio e inmediaciones (cf. Figuerola, 1983; Peris, 1983; Rivera, 1983 y 1985; Molina y Valdés, 1995; García Navarro, 1996; Molina, 2003; Molina y cols., 2008). Figs. 11 y 12.

La cita más cercana la hemos hallado en la provincia de Cuenca (cf. Mateo y Moreno, 2003: 27). En Albacete la encontramos en el año 2002, pero en varias visitas realizadas en los últimos tres años a la primera localidad donde fue herborizada no la hemos vuelto a ver en flor.

Es una hierba tóxica que se ha usado tradicionalmente como vesicante y se conoce popularmente como sardonía, hierba sardonía, apio sardónico, etc. (Font Quer, 1962: 229-230; Peris y cols., 2001: 535).

ALBACETE: 30SXJ4248, 650 m, Alborea, Casa Orejera. En charca manantial. *J. Gómez*, 10-10-02 (J. GÓMEZ 1428). **ALBACETE: 30SXJ4248**, 650 m, Alborea, Casa Orejera. En charca manantial. *J. Gómez*, 6-12-02 (J. GÓMEZ 1429). **ALBACETE: 30SXJ4248**, 650 m, Alborea, Casa Orejera. Balsa junto a manantial. *J. Gómez*, 12-6-03 (J. GÓMEZ 1564). **30SXJ3847**, 660 m, Alborea, Vado de La Cañada. Fondo de acequia seca. *J. Gómez*, 1-5-06 (MA 740682, ALBA 6501, J. GÓMEZ 2000).

Bolòs, O. de y J. Vigo (1984); Cook, C. D. K., y cols. (1986) in Castroviejo, S. y cols. (eds.); Font Quer, P. (1962); López González, G. (1986) in Castroviejo S. y cols. (eds.); Mateo, G. y M. B. Crespo (2003); Mateo, G. y J. M. Moreno (2003); Peris, J. B. y cols. (2001).

<http://www.anthos.es>