

*Zygaena (Zygaena) rhadamanthus* Esper, 1793

Especie mediterráneo-occidental que se extiende desde la Riviera italiana, por la costa francesa, hasta la Península Ibérica, donde solamente falta en el extremo Noroeste.




FIGURA N.º 12: Mapa de distribución de *Z. (Z.) rhadamanthus* Esper.




FIGURA N.º 13: Curva de vuelo de *Z. (Z.) rhadamanthus* Esper.

La oruga la hemos recolectado en su última muda sobre la planta nutricia, *Onobrychis viciaefolia?* el 19-V-90 en Arroyo Salado.

Los adultos comienzan a volar en los primeros días de Mayo, observándose el máximo de ejemplares hacia la segunda quincena del mismo mes y manteniéndose en vuelo hasta mediados de Junio, siempre en las inmediaciones de su planta nutricia, conocida en el vocabulario local como «*cernejuela*». Esta planta se desarrolla siempre sobre terrenos margosos o arcillosos, muy abundantes en la zona por el gran desarrollo que presenta el keuper del Trias, por lo que las colonias locales están muy bien representadas. Al atardecer, los adultos reposan, en su mayoría, sobre las inflorescencias de esta planta, lo que hemos aprovechado en bastantes ocasiones para poder examinarlos con detenimiento y fotografiarlos.

**LOCALIDADES:** 6) 28-V-78, 16-VI-79 y 25-V-80. 7) 22-V-82, 8-VI-80 y 6-V-89. 11) 11-V-85, 18-V-90 y 28-V-90 Aistleitner leg. 12) 25-V-81 y 18-V-80. 15) 12-V-85 y 22) 20-VI-82 Andújar leg.

Esta especie presenta una gran variabilidad en todos sus caracteres: tamaño alar, mayor o menor confluencia de las manchas rojas anteroalares, tono e intensidad de color de éstas, etc. De igual modo tiende a producir ejemplares aberrantes, con gran escamación oscura, unión de las manchas rojas, desaparición del cinturón abdominal rojo (f. *acingulata*), etc.