

El tipo fue descrito en 1793 de Languedoc (Francia) y en la Península Ibérica se han diferenciado once razas.




FOTO N.º 11: *Z. (Z.) rhadamanthus* Esper

- 1.ª fila: Riópar (Albacete). 1-3: ♂♂; 4: ♂ trans. a ssp. *caroniana* Reiss.
 2.ª fila: Riópar (Albacete). 1-3: ♀♀; 4: ♀ trans. a ssp. *aragonia* Tremewan.
 3.ª fila: S.ª de Guillimona (Granada). 1-2: ♂♂; 3-4: ♀♀.
 4.ª fila: Teruel. ssp. *aragonia* Tremewan. 1-2: ♂♂; 3-4: ♀♀.
 5.ª fila: Busot (Alicante). ssp. *caroniana* Reiss. 1-2: ♂♂; 3-4: ♀♀.

Los ejemplares de la zona presentan una gran variabilidad en cuanto a colocación del fondo alar, desde un gris acerado claro hasta un verde azulado oscuro, pasando por toda la gama intermedia. Son de gran tamaño y presentan las alas superiores anchas y redondeadas. Por sus características pudieran constituir una nueva raza que estamos estudiando, cuyas características publicaremos en breve.

Especies parecidas: Ninguna.