

pubescente. Élitros recubiertos de tomento sin formar bandas netamente distintas. (Subgen. **Baeticodorcadion**) 3

2. Tegumento rojizo oscuro casi negro. *I. (H.) fuentei*
- Tegumento rojizo muy claro. *I. (H.) bolivari*
3. Base de los élitros con pliegues humerales o depresiones fuertemente punteadas. 4
- Base de los élitros sin pliegues en la zona humeral, a veces tienen leves depresiones poco manifiestas. 6
4. Cabeza con puntuación densa, gruesa y profunda, recorrida en toda su longitud por un surco profundo. *I. (B.) marmottani*
- Cabeza con una puntuación más fina y/o espaciada, presentando una cicatriz fina que la surca longitudinalmente. 5
5. Élitros con puntuación fuerte y espaciada, los pliegues humerales formando costillas poco marcadas. Protórax fuertemente punteado. Élitros (generalmente las hembras) cubiertos de tomento claro y caedizo. La sutura con una serie de sedas blanquecinas dando una imagen de una banda sutural. *I. (B.) amori*
- Puntuación de los élitros gruesa en la base, extendiéndose por los élitros formando alineaciones que se atenúan hacia el ápice, éste finamente punteado, sin tomento manifiesto. Protórax con puntuación fina. *I. (B.) iserni*
6. Especies de tamaño mediano con el protórax fuertemente punteado, con tres abultamientos lisos discales y sin línea mediana. Antenas apenas alcanzando la mitad de los élitros. Protuberancias laterales agudas. Tomento pardo oscuro con la sutura elitral de coloración dorada. *I. (B.) suturale*
- Especies de tamaño más grande, con el protórax más finamente punteado y sin abultamientos especiales. Tomento pardo o gris oscuro, formando bandas o con manchas más oscuras irregulares. 7
7. Élitros con pubescencia gris o parda formando bandas con tomento más oscuro, bien marcadas en el disco y difuminándose hacia los laterales. *I. (B.) mucidum*
- Élitros con pubescencia parda uniforme, con algunas manchas irregulares y poco extendidas de tomento más oscuro, casi negro. *I. (B.) nigrosparsum*