

Adiantum capillus-veneris* L., Sp. Pl.: 1096 (1753)*Familia:** PTERIDACEAE**Nombres comunes:** Adianto, culantrillo de pozo, capilera, arañuela, cabellera de Venus, cabello de Venus, zancamorenilla.**Descripción (Figura 2):** Rizoma: rastrero, densamente cubierto de páleas castañas. Fronde: más o menos persistentes, de 10 a 30 cm, hasta 60 en algunos casos. Pecíolo: entre negro brillante y pardo, de longitud igual o menor que la lámina. Lámina: oval u oval-lanceolada, de color verde claro brillante. Aspecto delicado, de 1 a 4 veces pinnada. Pínnulas: de tamaño muy variable, pecioluladas, flabeladas, cuneadas en la base, irregularmente lobadas en el ápice. Venas: muy finas, divididas dicotómicamente. Soros: marginales, protegidos por un pseudoindusio originado a partir del margen reflexo de las pínnulas. Esporas: subgloboso-tetraédricas, entre 34 y 46 μm y perisporio granuloso. Esporulación: durante todo el año, especialmente de junio a septiembre.**Ecología y biotipo:** Fisuras de muros, cuevas y paredes rezumantes sobre todo calizas. Ambientes acuáticos e hidrófilos. 0-1400 m. Hemicriptófito.**Corología:** Subcosmopolita; zonas tropicales, subtropicales y templadas del Globo. Riberas de los ríos de la provincia de Albacete y zonas rezumantes calizas (Figura 1).**Usos:** Acción emoliente, expectorante, béquica, diurética y astringente. Planta amenorreica (Sierra de Segura y el Campo de Hellín) y reguladora del ciclo menstrual (Sierra de Segura y La Manchuela). Usada generalmente como abortiva en la provincia.***Anogramma leptophylla* (L.) Link, Fil. Sp. Cultae: 137 (1841)***Polypodium leptophyllum* L., Sp. Pl.: 1092 (1753) [basión.]*Grammitis leptophylla* (L.) Swartz., Syn. Fil.: 23 (1806)*Gymnogramma leptophylla* (L.) Desv., in Ges. Naturf. Freunde Berlin Mag. Neuesten Entdeck. Gesamten Naturk. 5: 305 (1811)**Familia:** PTERIDACEAE**Nombres comunes:** Helecho de tiempo.**Descripción (Figura 4):** Rizoma: muy pequeño, cubierto de páleas lineares ferrugíneas. Fronde: de dos tipos, las externas, de 3 a 9 cm y estériles, y las internas, de 7 a 20 cm y fértiles. Pecíolo: de igual tamaño que la lámina, ligeramente castaño. Lámina: de ovado-lanceolada a triangular, 2-3 veces di-